

تحقیقات غلات

دوره ششم / شماره چهارم / زمستان ۱۳۹۵ (۴۶۴-۴۵۱)

بررسی سازگاری ژنتیکی‌های گندم نان با استفاده از روش‌های ابرهارت راسل، غیرپارامتری رتبه‌ای، گزینش همزمان و بای‌پلات

علیرضا تاری نژاد*

تاریخ پذیرش: ۹۴/۱۱/۵

تاریخ دریافت: ۹۳/۵/۲۶

چکیده

به منظور مطالعه برهمکنش ژنتیک × محیط و سازگاری بیست ژنتیک پیشرفته گندم نان بهاره از نظر عملکرد و اجزای عملکرد دانه، آزمایشی با استفاده از طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با دو تکرار طی سال‌های زراعی ۱۳۹۰-۹۳ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی تبریز و میانه در مجموع در پنج محیط (ترکیب سال و مکان) اجرا شد. تجزیه مرکب داده‌ها نشان داد که برهمکنش ژنتیک × محیط برای تمام صفات مورد اندازه‌گیری (عملکرد دانه، وزن هزار دانه، تعداد دانه در سنبله و تعداد سنبله در واحد سطح) حداقل در سطح احتمال پنج درصد معنی‌دار بود. بر این اساس، تجزیه پایداری ژنتیک‌ها بر اساس روش ابرهارت و راسل، روش غیرپارامتری رتبه‌ای و روش گزینش همزمان برای عملکرد دانه و اجزای آن انجام شد. نتایج تلفیق این روش‌ها نشان داد که از نظر وزن هزار دانه ژنتیک‌های شماره ۱۴ و ۸، تعداد دانه در سنبله ژنتیک‌های شماره ۱، ۵ و ۶، تعداد سنبله در واحد سطح ژنتیک‌های شماره ۱۷ و ۱، ضمن داشتن برهمکنش کمتر با محیط نسبت به سایر ژنتیک‌ها، از پتانسیل تولید بالاتری نیز برخوردار بودند، اما از نظر عملکرد دانه، ژنتیک شماره ۵ با شجره Yang87-158 و ژنتیک شماره ۸ با شجره Milan CM75118-B-5M-1Y-05M بهترین ژنتیک با عملکرد ۶/۴۷ و ۶/۳۸ تن در هکتار سازگاری بیشتر و برهمکنش کمتری با محیط داشتند و قبل توصیه جهت کشت در اقلیم مشابه از نظر آب و هوایی هستند. همچنین، نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که در تجزیه اثر متقابل ژنتیک × محیط، روش رتبه‌ای تا حدود زیادی نتیجه مشابه‌ای با روش گزینش همزمان ارایه می‌دهد.

واژه‌های کلیدی: برهمکنش ژنتیک × محیط، پایداری، عملکرد و اجزای عملکرد دانه

۱- دانشیار، گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

* نویسنده مسئول: atarinejad@yahoo.com

مقدمه

را در محیط‌های مختلف به عنوان معیار پایداری ارقام پیشنهاد داد و آن را واریانس پایداری نام‌گذاری کرد. Francis and Kannenberg (1987) جهت تعیین پایداری ارقام ذرت از ضریب تغییرات ژنتیکی استفاده کردند تا همبستگی احتمالی بین میانگین عملکرد و واریانس ارایه شده توسط رومر را حذف کنند. کانگ (Kang, 1993) با ادغام روش غیرپارامتریک (رتبه‌بندی) و پارامتریک (واریانس شوکلا)، روش گزینش همزمان عملکرد و پایداری را معرفی کرد. یان و همکاران (Yan *et al.*, 2000) نیز روش GGE Biplot را جهت تحلیل برهمکنش ژنتیک × محیط ارایه کردند. روش GGE Biplot ابزاری بسیار مفید جهت ارزیابی چشمی و تفسیر پاسخ الگوی ارقام، محیط‌ها و برهمکنش آن‌ها است. با پلات نمایش گرافیکی و ارایه رفتار همزمان دو متغیر است که برای اولین بار توسط گابریل (Gabriel, 1971) پیشنهاد شد و سپس استفاده از آن در تجزیه پایداری ارقام بر اساس داده‌های دوطرفه ژنتیک و برهمکنش ژنتیک × Yan (et al., 2000) ارایه شد. ویژگی منحصر به‌فرد این روش، گروه‌بندی محیط‌هایی است که دارای رفتار مشابهی بوده‌اند و به صورت گرافیکی می‌تواند مشخص کند کدام رقم در کدام محیط یا زیرگروه از پتانسیل بالاتری برخوردار است (Gauch, 2006; Yang *et al.*, 2009).

به هر حال، مطالعه سازگاری و پایداری ارقام در شرایط محیطی مختلف، اهمیت ویژه‌ای در برنامه‌های اصلاحی و معرفی رقم دارد، زیرا با استفاده از آن می‌توان رقمی که عملکرد قابل قبولی در همه مناطق اقلیمی دارد و دارای سازگاری عمومی خوبی با محیط‌های مختلف است را انتخاب و توصیه کرد (Dashtaki *et al.*, 2004).

بر این اساس، پژوهش حاضر جهت مطالعه برهمکنش ژنتیک × محیط و بررسی سازگاری ژنتیک‌های پیشرفت‌های گندم نان بهاره برای عملکرد دانه و اجزای آن تحت شرایط اقلیمی مختلف در استان آذربایجان شرقی اجرا شد و هدف از آن شناسایی ژنتیک‌های با بیشترین سازگاری به هر یک از مناطق مورد مطالعه بود.

مواد و روش‌ها

مواد گیاهی این تحقیق شامل بیست ژنتیک پیشرفت‌های گندم نان بهاره بود که اسامی این ژنتیک‌ها در جدول ۱ ارایه شده است. آزمایش با استفاده از طرح پایه بلوک‌های

به‌طورکلی سازگاری مفهوم پیچیده‌ای دارد، اما در تعریفی خلاصه می‌توان گفت سازگاری عبارت از ظرفیت ژنتیکی یک رقم برای ظهور عملکرد بالا و پایدار در محیط‌های متفاوت است (Mahfouzi *et al.*, 2009). نظر به این که تهیه ارقام اصلاح‌شده با عملکرد بالا و سازگار برای هر محیط از نظر اقتصادی مستلزم هزینه سنگین و صرف وقت زیاد است، باید سعی کرد ارقامی انتخاب شوند که برای چند منطقه متفاوت قابل توصیه باشند، به عبارت دیگر ارقامی که در همه مناطق اقلیمی مشابه و یا حداقل در اغلب آن‌ها، ضمن داشتن عملکرد قابل قبول، بیشترین سازگاری را با محیط‌های مختلف داشته باشند (Akcura *et al.*, 2006). معرفی لاین‌های با عملکرد بالا و سازگار با مناطق دارای شرایط آب و هوایی متنوع یکی از راه‌های افزایش تولید گندم است. عملکرد گیاهان تحت تاثیر عوامل متعدد محیطی و برهمکنش این عوامل با ژنتیک گیاه قرار می‌گیرد که مجموعه این عوامل، رشد و نمو گیاه را متأثر می‌سازند (Jarrah and Geng, 1997). برای انتخاب و معرفی ارقام پرمحصول و پایدار، آزمایش‌های مقایسه عملکرد تکراردار در چند سال و چند مکان انجام می‌شود. در این آزمایش‌ها، ضروری است علاوه بر میزان عملکرد دانه، سازگاری ژنتیک‌ها به محیط‌های مختلف نیز در معرفی آنها مدنظر قرار گیرد (Soughi *et al.*, 2009).

روش‌های متعددی جهت تحلیل برهمکنش ژنتیک × محیط و برآورد سازگاری و پایداری ژنتیک‌ها توسط Rommer, (1947) برای اولین بار از واریانس ارقام در محیط‌های مختلف برای تعیین پایداری استفاده کرد. بر این اساس، ژنتیک پایدار است که دارای کمترین واریانس محیطی باشد. ریک (Wricke, 1962) پیشنهاد کرد که از سهم هر ژنتیک در تشکیل برهمکنش ژنتیک × محیط، که آن را اکوالنس نام‌گذاری کرد، به عنوان پارامتر پایداری استفاده شود. ابرهارت و راسل (Eberhart and Russell, 1966) پاسخ قابل پیش‌بینی ژنتیک‌ها را در شرایط محیطی مختلف با شاخص پایداری ضریب رگرسیون خطی و پاسخ غیرقابل پیش‌بینی آن‌ها را با شاخص انحراف از رگرسیون خطی نشان دادند و ارقام با سازگاری عمومی برای تمامی مناطق و خصوصی برای هر منطقه را شناسایی کردند. شوکلا (Shukla, 1972)، بر اساس باقی‌مانده حاصل از طبقه‌بندی دوطرفه ژنتیک × محیط، واریانس هر ژنتیک

طور مرتب و متناسب با روند رشد، فنولوژی گیاه و شرایط آب و هوایی منطقه به طور یکسان برای کلیه تیمارها انجام شد. کود نیتروژن از منبع نیترات آمونیم در دو نوبت قبل از پنجه‌زنی و ظهرور سنبله به میزان ۱۰ گرم در مترمربع به صورت سرک پخش شد. کنترل علفهای هرز به صورت دستی در چندین مرحله انجام شد. برای اندازه‌گیری تعداد دانه در سنبله پس از حذف اثر حاشیه، به طور تصادفی ده بوته از هر کرت انتخاب و از میانگین آن‌ها برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد. عملکرد دانه و تعداد سنبله در هر کرت پس از حذف حاشیه در یک مترمربع تعیین شد.

کامل تصادفی با دو تکرار طی سال‌های زراعی ۹۳-۹۰ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی تبریز (به مدت سه سال زراعی) و میانه (دو سال زراعی)، جمعاً در پنج محیط (ترکیب سال و مکان) اجرا شد. اقلیم منطقه بر اساس طبقه‌بندی دما‌ترن، نیمه خشک سرد با تابستان‌های گرم و زمستان‌های سرد است (Nadergoli *et al.*, 2011). هر کرت آزمایشی شامل ۵ ردیف به طول ۲/۱ متر با فاصله خطوط ۲۰ سانتی‌متر بود و میزان بذر ۴۰۰ دانه در متر مربع در نظر گرفته شد. عملیات مربوط به کاشت در اسفندماه هر سال انجام شد. بلافاصله بعد از کاشت، آبیاری در هفته اول فروردین صورت گرفت و آبیاری‌های بعدی به

جدول ۱- شجره ژنوتیپ‌های مورد استفاده در تجزیه پایداری

Table 1. The pedigree of genotypes used in stability analysis

ژنوتیپ Genotype	شجره Pedigree	ژنوتیپ Genotype	شجره Pedigree
1	Tajan	11	Siren 64609-6Y-3M-2Y-OM
2	Opata/Bow CM 88503-23M-OY-OM-4Y-9M	12	Star "S" SWM7215-2Y-2Y-OY-16M-OY
3	Pgo/Seri CM85817-27Y-OM-OY-7M-OY	13	Turaco/Chil CM922354-61Y-OM-OYO-3M
4	Jup/Ald "S"//Kt "S"//3/Vee "S"	14	Nanjing 8319/Lira
5	Yang87-158	15	Nai60/Hn7//Sy SWM70053-2Y-1Y-OY-2AP
6	Rayan 89	16	Shanghai 7//Hahn "S"//2prl "S" CM95119-3Y-OM-OY
7	TJb368351/Buc//CupeCM89Y-30B-12Y8M-3Y-OB	17	Inia/A.Distichum//Inia/3/Vee "S"//4/Kauz
8	Milan CM75118-B-5M-1Y-05M	18	Kauz*2/MNV//kauz
9	Attila "S"//Arvand/Vee "S"	19	Kauz*2/Opata//kauz
10	Tan "S"//Pew "S"//Sara CM..	20	Bjouudan/3/Bb/7C*2//Y50E/Kal*3/CW84..

در روش ابرهارت و راسل (Eberhart and Russell, 1966) از مدل ارایه شده در رابطه (۱) استفاده شد:

$$x_{ij} = \bar{x}_i + \beta_i I_j + E_{ij} \quad (1)$$

بر این اساس، ابتدا شبیه خط رگرسیون هر ژنوتیپ (β_i) محاسبه و سپس واریانس انحراف از رگرسیون آن ژنوتیپ ($S_{d_i}^2$) که معیار اصلی پایداری در این روش است، با استفاده از رابطه (۲) تعیین شد:

$$S_{d_i}^2 = \frac{\sum_{j=1}^q (x_{ij} - \bar{x}_{i.})^2 - b^2 \sum_{j=1}^q (\bar{x}_{i.j} - \bar{x}_{..})^2}{q-2} \quad (2)$$

برای تجزیه برهمکنش ژنوتیپ × محیط به روش غیرپارامتری رتبه‌ای، ابتدا میانگین ژنوتیپ‌ها برای هر سال رتبه‌بندی شد، به این صورت که به ژنوتیپ با بیشترین مقدار صفت (عملکرد و اجزای عملکرد) در هر محیط رتبه یک و به ژنوتیپ با کمترین مقدار، رتبه ۲۰ اختصاص داده شد. سپس، برای هر ژنوتیپ، میانگین، واریانس و انحراف معیار رتبه تعیین شد. بر این اساس، ژنوتیپ‌هایی که دارای انحراف معیار رتبه کمتری باشند، پایدار و ژنوتیپ‌هایی که دارای میانگین رتبه کمتری باشند، پرمحصول خواهند بود (Najafi Mirak, 2011).

تجزیه واریانس مرکب برای تمامی صفات اندازه‌گیری شده انجام و نتایج آن در جدول ۲ ارایه شد. همان‌طور که مشاهده می‌شود، اثر محیط روی صفات وزن هزار دانه، تعداد دانه در سنبله و تعداد سنبله در واحد سطح حداقل در سطح احتمال پنج درصد معنی دار بود. به عبارت دیگر می‌توان اظهار داشت که عوامل محیطی مانند نزولات آسمانی، حداقل و حداکثر دمای هوا و خاک و سایر عوامل در آزمایش‌های مختلف یکسان نبودند و در نتیجه اثر آن‌ها بر اجزای عملکرد معنی دار شد. در مقابل، اثر محیط روی عملکرد دانه ارقام معنی دار نبود.

اختلاف بین ژنتیپ‌های مورد مطالعه نیز فقط از نظر عملکرد دانه در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. معنی داری اثر اصلی ژنتیپ نشان‌دهنده تفاوت‌های ژنتیکی بین آن‌ها از نظر عملکرد دانه می‌باشد. در مقابل، از نظر وزن هزار دانه، تعداد دانه در سنبله و تعداد سنبله در مترمربع، اختلاف معنی داری بین ژنتیپ‌ها مشاهده نشد. با این حال، برهمکنش ژنتیپ × محیط برای صفات مورد اندازه‌گیری حداقل در سطح احتمال پنج درصد معنی دار شد و نشان داد که واکنش ژنتیپ‌های مختلف در محیط‌های مختلف متفاوت یکسان نبوده و دارای نوسانات آماری معنی داری بوده‌اند. به این ترتیب، می‌توان برهمکنش ژنتیپ × محیط را جهت شناسایی ژنتیپ‌های پرمحصول و پایدار مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

نتایج حاصل از تجزیه پایداری ژنتیپ‌ها برای عملکرد دانه با روش غیرپارامتری رتبه‌ای در جدول ۳ ارایه شده است. کمترین میانگین رتبه متعلق به ژنتیپ شماره ۵ با میانگین Error! Bookmark not defined.۱ پس از آن به ترتیب ژنتیپ‌های شماره ۱، ۶، ۸ و ۱۷ با میانگین رتبه ۵/۲، ۵/۶، ۶/۶ و ۷/۶ کمترین رتبه را داشتند. محاسبه انحراف معیار رتبه (SDR) نیز نشان داد که ژنتیپ شماره ۵ با انحراف معیار رتبه صفر، کمترین مقدار انحراف معیار رتبه را داشت و بعد از آن ژنتیپ‌های ۲۰، ۷، ۱۳، ۶ و ۱۱ به ترتیب با انحراف معیار ۲۰/۷، ۳/۴۹، ۳/۱۳ و ۳/۰۸ دارای کمترین مقدار بودند. نتایج ضریب تغییرات نیز با نتایج انحراف معیار کاملاً مشابه بود (جدول ۳). بر اساس نتایج حاصل از این روش، ژنتیپ شماره ۵ با توجه به میانگین، انحراف معیار و ضریب تغییرات رتبه کمتر، پایدارترین و پرمحصول‌ترین ژنتیپ از نظر عملکرد دانه بود.

در این روابط، \bar{x}_{ij} میانگین عملکرد ژنتیپ i در محیط j ، \bar{x}_i میانگین عملکرد تمامی ژنتیپ‌ها برای محیط j ، \bar{x} میانگین کل (میانگین عملکرد تمامی ژنتیپ‌ها در تمامی محیط‌ها)، β شب خط رگرسیون ژنتیپ i ، I_j شاخص محیط j (تفاوت میانگین محیط j از میانگین کل) و E_{ij} خطای مدل است.

ضریب تبیین پینتوس (Pinthus, 1973) برای تعیین سازگاری ژنتیپ‌ها بر اساس رابطه (۳) محاسبه شد (اجزای موجود در این رابطه مشابه رابطه (۲) هستند):

$$R_i^2 = \frac{b^2 \sum_{j=1}^q (\bar{x}_{ij} - \bar{x}_i)^2}{\sum_{j=1}^q (x_{ij} - \bar{x}_i)^2} \quad (3)$$

در روش گزینش همزمان عملکرد و پایداری (Kang et al., 1993) نیز ابتدا ژنتیپ‌ها بر مبنای عملکرد رتبه‌بندی و رتبه تصحیح شده هر ژنتیپ بر اساس آزمون LSD تعیین شد. سپس واریانس شوکلا (Shukla, 1972) به عنوان معیار پایداری ژنتیپ‌ها محاسبه و رتبه پایداری هر ژنتیپ بر مبنای معنی دار شدن یا نشدن این واریانس در سطوح احتمال مختلف تعیین شد. ژنتیپ‌های دارای مجموع رتبه (رتبه تصحیح شده عملکرد و رتبه پایداری) بیشتری بودند، به عنوان ژنتیپ‌های با عملکرد بیشتر و پایدار معرفی شدند.

در نهایت، از روش گرافیکی GGEbiplot (Yan et al., 2000) نیز به منظور شناسایی و معرفی ژنتیپ‌های پرمحصول و پایدار و تعیین محیط‌ها و ژنتیپ‌های ایده‌آل استفاده شد.

به منظور تجزیه‌های و تحلیل‌های آماری مربوطه از نرم‌افزارهای MSTAT-C و SAS استفاده شد (Alizadeh and Tarinejad, 2010; Soltani, 2012). قبل از انجام تجزیه مرکب، آزمون نرمال‌بودن داده‌ها و یکنواختی واریانس خطاهای آزمایشی با استفاده از آزمون بارتلت بررسی شد.

نتایج و بحث

نتیجه آزمون یکنواختی واریانس خطاهای آزمایشی نشان داد که پنج آزمایش انجام شده دارای واریانس خطای یکنواختی هستند و بنابراین می‌توان تجزیه واریانس مرکب را برای کل داده‌ها انجام داد. از این‌رو،

برخی از ژنوتیپ‌ها دارای انحراف از رگرسیون معنی‌دار بودند و به عبارت دیگر، بعضی از ژنوتیپ‌ها یک واکنش غیرقابل پیش‌بینی نسبت به تغییرات محیطی داشتند. واریانس انحراف از رگرسیون برای ژنوتیپ‌های ۶، ۷، ۹، ۱۰ و ۱۳ معنی‌دار نبود که نشان‌دهنده توانایی خوب مدل رگرسیون خطی در توجیه تغییرات عملکرد این ژنوتیپ‌ها در محیط‌ها و تمرکز نقاط عملکرد هر ژنوتیپ در اطراف خط رگرسیون است.

نتایج تجزیه پایداری ژنوتیپ‌ها برای عملکرد دانه به روش ابرهارت و راسل (Eberhart and Russell, 1966) در جدول ۴ ارایه شده است. اثر محیط (خطی) در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار بود که حاکی از این است که یک رابطه خطی برای تنوعات محیطی یا تغییرات عملکرد محیط‌ها (شاخص‌های محیطی) وجود دارد. برهمکنش ژنوتیپ × محیط (خطی) غیرمعنی‌دار بود، اما انحراف از رگرسیون خطی معنی‌دار شد که نشان می‌دهد حداقل

جدول ۲- تجزیه واریانس مرکب صفات مورد اندازه‌گیری در ۲۰ رقم گندم نان در پنج محیط

Table 2. Combined analysis of variance for the studied traits in 20 bread wheat genotypes in five environments

منابع تغییرات Source of variation	محیط	آزادی Df	تعداد دانه در سنبله در واحد No. of grain/spike	تعداد سنبله در واحد No. of spike/m ²	وزن هزار دانه 1000-grain weight	عملکرد دانه Grain yield
Environment (E _n)	محیط	4	4585.57**	400915.6**	629.01*	31.77 ^{ns}
Replication/E _n	تکرار درون محیط	5	129.48	5175.96	108.89	16.31
Genotype (G)	ژنوتیپ	19	149.42 ^{ns}	8737.59 ^{ns}	53.35 ^{ns}	28.38**
G×E _n	ژنوتیپ×محیط	76	92.9**	9366.3**	52**	3.58**
Error	خطای آزمایش	95	15.465	3058.02	8.25	0.489
CV (%)	ضریب تغییرات (درصد)	-	14.87	20.03	9.39	18.09

ns، * و **: به ترتیب غیرمعنی‌دار و معنی‌دار در سطوح احتمال ۱٪ و ۵٪.

^{ns}, * and **: not-significant and significant at 5% and 1% probability levels, respectively.

جدول ۳- تجزیه پایداری عملکرد دانه به روش رتبه‌ای

Table 3. The stability analysis of grain yield (t/ha) by rank method

ژنوتیپ Genotype	میانگین عملکرد دانه Grain yield	میانگین رتبه Rank mean	انحراف معیار رتبه SDR	ضریب تغییرات CV
1	5.623	5.2	5.54	107
2	3.29	12.6	5.68	45
3	2.40	17.4	3.58	21
4	3.81	9.6	5.73	60
5	6.48	1.0	0.00	0
6	4.08	6.6	3.13	47
7	3.04	14.4	2.60	18
8	6.38	7.6	6.58	87
9	3.32	9.4	4.10	44
10	2.85	14.0	4.90	35
11	3.66	7.8	3.49	45
12	2.30	16.0	4.00	25
13	3.51	9.0	3.08	34
14	3.24	10.8	6.34	59
15	3.38	10.4	5.13	49
16	3.20	12.0	5.83	49
17	5.00	8.0	6.00	80
18	2.94	12.0	6.75	56
19	2.78	12.2	5.36	44
20	2.84	14.4	2.07	14
میانگین Mean	3.87	10.5	4.50	45.95

جدول ۴- تجزیه واریانس پایداری عملکرد دانه ژنتیپ‌های گندم نان به روش ابرهارت و راسل

Table 4. Stability analysis of variance for grain yield of bread wheat genotypes by Eberhart and Russell method

Source of variation	منابع تغییرات	درجه آزادی df	میانگین مربعات عملکرد دانه Mean square of grain yield
Total	کل	99	-
Genotype	ژنتیپ	19	14.19**
Env+(Env*g)	محیط + (ژنتیپ × محیط)	80	2.49ns
Env(linear)	محیط (خطی)	1	63.5**
G*Env(linear)	ژنتیپ × محیط (خطی)	19	1.72ns
Devition from regression	انحراف از رگرسیون	60	1.72**
Genotype1	ژنتیپ ۱	3	3.93**
Genotype2	ژنتیپ ۲	3	0.87*
Genotype3	ژنتیپ ۳	3	1.05**
Genotype4	ژنتیپ ۴	3	0.97*
Genotype5	ژنتیپ ۵	3	2.43**
Genotype6	ژنتیپ ۶	3	0.08ns
Genotype7	ژنتیپ ۷	3	0.03ns
Genotype8	ژنتیپ ۸	3	6.73**
Genotype9	ژنتیپ ۹	3	0.16ns
Genotype10	ژنتیپ ۱۰	3	0.23ns
Genotype11	ژنتیپ ۱۱	3	0.31ns
Genotype12	ژنتیپ ۱۲	3	0.4ns
Genotype13	ژنتیپ ۱۳	3	0.24ns
Genotype14	ژنتیپ ۱۴	3	1.10*
Genotype15	ژنتیپ ۱۵	3	1.47**
Genotype16	ژنتیپ ۱۶	3	0.91*
Genotype17	ژنتیپ ۱۷	3	8.81**
Genotype18	ژنتیپ ۱۸	3	2.56**
Genotype19	ژنتیپ ۱۹	3	1.67**
Genotype20	ژنتیپ ۲۰	3	0.36ns
Pooled Error	خطای ادغام شده	95	0.24

ns، * و **: به ترتیب غیرمعنی‌دار و معنی‌دار در سطوح احتمال ۵٪ و ۱٪.

ns, * and **: Not-significant and significant at 5% and 1% probability levels, respectively.

بر اساس واریانس انحراف از رگرسیون (جدول ۵)، ژنتیپ‌های ۷، ۶، ۹، ۱۱، ۱۰ و ۱۳ بهترتب با انحراف ۰/۰۳، ۰/۰۸، ۰/۱۶، ۰/۲۳، ۰/۲۴ و ۰/۳۱ کمترین واریانس انحراف از رگرسیون را داشتند و به عنوان پایدارترین ژنتیپ‌ها شناسایی شدند. نتایج حاصل از ضریب تشخیص (جدول ۵) نیز نشان داد که بهترتب ژنتیپ‌های ۷، ۶، ۹، ۱۰ و ۱۳ بیشترین ضریب تشخیص را داشتند و ژنتیپ‌های پایداری بودند. به طور کلی، در میان ژنتیپ‌های مطالعه شده، ژنتیپ‌های ۷، ۶، ۹ و ۱۰ با توجه به ضریب رگرسیون نزدیک به یک، واریانس

نتایج شاخص‌های رگرسیونی روش ابرهارت و راسل (Eberhart and Russell, 1966) در جدول ۵ ارایه شده است. بر اساس این نتایج، ژنتیپ‌های ۷، ۶، ۹، ۱۳، ۱۰، ۱۱، ۱۶ و ۲۰ بهترتب با ضریب رگرسیون خطی ۰/۹۸۹، ۰/۸۷۲، ۰/۸۷۹، ۰/۹۱۲، ۰/۹۱۷، ۰/۹۱۷ و ۰/۹۸۵ نسبت به سایر ژنتیپ‌ها دارای ضریب رگرسیونی غیرمعنی‌دار نسبت به شبیه خط رگرسیون یک بودند (جدول ۵). ژنتیپ ۶ با میانگین عملکرد ۴۰۸۳ تن در هکتار بالاتر از میانگین کل به عنوان رقمی با پایداری و سازگاری خوب به مناطق مورد مطالعه شناخته شد.

اگرچه دارای میانگین عملکرد بالای بودن، اما به علت داشتن ضریب رگرسیون معنی‌دار از شب خط یک و واریانس انحراف از رگرسیون بالا و معنی‌دار به عنوان ژنتیک‌های با کمترین پایداری معرفی شدند.

انحراف از رگرسیون کوچک و غیرمعنی‌دار از صفر و میانگین عملکرد بالا به عنوان ژنتیک‌های پرمحلول و پایدار بر اساس مدل ابرهارت و راسل (Eberhart and Russel, 1966) شناسایی شدند. ژنتیک‌های ۸ و ۱۷ نیز

جدول ۵- شاخص‌های پایداری عملکرد دانه ژنتیک‌های گندم نان با استفاده از روش رگرسیونی ابرهارت و راسل

Table 5. Stability parameters for grain yield of bread wheat genotypes by Eberhart and Russel regression method

ژنتیک	عملکرد دانه Genotype	ضریب رگرسیون Regression coefficient	واریانس انحراف از رگرسیون Deviation variance from regression	ضریب تشخیص R^2
1	5.623	0.710	3.93**	0.503
2	3.290	0.770	0.87*	0.592
3	2.402	0.754	1.05**	0.569
4	3.812	0.839	0.97*	0.705
5	6.475	-0.473	2.43**	0.223
6	4.083	0.985	0.08 ^{ns}	0.971
7	3.039	0.989	0.03 ^{ns}	0.979
8	6.382	-0.396	6.73**	0.157
9	3.317	0.917	0.16 ^{ns}	0.841
10	2.851	0.912	0.23 ^{ns}	0.832
11	3.660	0.872	0.31 ^{ns}	0.760
12	2.301	0.732	0.40 ^{ns}	0.536
13	3.508	0.911	0.24 ^{ns}	0.830
14	3.247	0.675	1.10*	0.455
15	3.386	0.791	1.47**	0.626
16	3.201	0.851	0.91*	0.725
17	5.195	0.490	8.81**	0.241
18	2.944	0.565	2.56**	0.319
19	2.778	0.614	1.67**	0.377
20	2.836	0.879	0.36 ^{ns}	0.773
Mean	3.866	0.669	1.72	0.601

ns، * و **: به ترتیب غیرمعنی‌دار و معنی‌دار در سطوح احتمال ۵٪ و ۱٪.

ns, * and **: Not-significant and significant at 5% and 1% probability levels, respectively.

مقابل، ژنتیک‌های ۱۱، ۱۲، ۱۰، ۱، ۲۰، ۷، ۳، ۲۰ و ۲ به ترتیب با داشتن کمترین میزان اثر توأم تعداد دانه در سنبله و پایداری، به عنوان ضعیفترین ژنتیک‌ها از لحاظ این دو پارامتر بودند.

نتایج حاصل از روش گزینش همزمان برای تعداد سنبله در مترمربع در جدول ۸ ارایه شده است. چنانچه مشاهده می‌شود، ژنتیک‌های ۶، ۱۷، ۱، ۱۰، ۱۶، ۵، ۲، ۱۲ و ۷ به ترتیب از نظر این شاخص دارای ارزش‌های بالاتر از میانگین بودند و از این‌رو به عنوان ژنتیک‌های برتر انتخاب شدند. در مقابل، ژنتیک‌های ۱۱، ۸، ۱، ۱۸، ۴، ۳، ۹، ۲۰، ۱۳، ۱۴ و ۱۹ به ترتیب ارزش‌های کمتری از میانگین برای اثر توأم تعداد سنبله در مترمربع و پایداری داشتند و از این‌رو به عنوان ضعیفترین ژنتیک‌ها معرفی شدند.

نتایج حاصل از روش گزینش همزمان برای صفت وزن هزار دانه در جدول ۶ ارایه شده است. در این روش ژنتیک‌هایی که وزن هزار دانه و پایداری بالاتر از میانگین کل دارند، به عنوان ژنتیک‌های مطلوب انتخاب می‌شوند. ژنتیک‌های ۵، ۱۴، ۸، ۱۱، ۱ و ۱۷ به ترتیب به عنوان ژنتیک‌های برتر از نظر میانگین وزن هزار دانه و پایدار این صفت و ژنتیک‌های ۱۶، ۴، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۳ و ۱ با داشتن کمترین میزان اثر توأم وزن هزار دانه و پایداری به ترتیب به عنوان ضعیفترین ژنتیک‌ها معرفی شدند.

نتایج حاصل از روش گزینش همزمان برای تعداد دانه در سنبله و پایداری ژنتیک‌های گندم نان در جدول ۷ ارایه شده است. بر این اساس، ژنتیک‌های ۶، ۱، ۱۹، ۵، ۱۷، ۱۴ و ۴ به ترتیب از نظر شاخص گزینش همزمان، پایداری و عملکرد بالاتری برای این صفت داشتند و در

از متصل کردن دورترین ژنوتیپ‌ها از مبدأ با پلات به یکدیگر ایجاد می‌شود که با استفاده از این با پلات و چندضلعی درون آن می‌توان بهترین محیط و رقم را شناسایی کرد. در این با پلات، چهار بخش قابل مشاهده است و در هر بخش نیز بهترین ژنوتیپ، ژنوتیپی است که در رأس چندوجهی قرار دارد. این ژنوتیپ‌ها از نظر عملکرد بهترین و یا ضعیفترین ژنوتیپ‌ها در بعضی از محیط‌ها و یا همه محیط‌ها بودند. براساس شکل ۱ ژنوتیپ‌های ۵، ۳، ۱۷ و ۱۸ در رأس این چندضلعی قرار گرفته‌اند. در پنج محیط، ژنوتیپ‌های ۵، ۱۷ و ۸ به عنوان ژنوتیپ‌های با پایداری و عملکرد بالاتر معرفی شدند و ژنوتیپ‌های ۷، ۱۵ و ۶ که نزدیک مرکز با پلات قرار دارند، دارای عملکرد متوسطی در محیط‌ها بوده‌اند.

نتایج حاصل از روش گزینش همزمان برای عملکرد دانه در جدول ۹ ارایه شده است. نتایج نشان داد که بهترتب ژنوتیپ‌های شماره ۶، ۵، ۱، ۸، ۱۳، ۱۱، ۱۷، ۴ و ۹ دارای ارزش‌های بالاتر از میانگین بودند و به عنوان ژنوتیپ‌های پایدار و پرمحصول انتخاب شدند. ژنوتیپ‌های ۳، ۱۹، ۱۸، ۱۲، ۲۰، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۰ و ۲ نیز بهترتب با داشتن کمترین میزان اثر توام عملکرد و پایداری، ضعیفترین ژنوتیپ‌ها از نظر پایداری و عملکرد بودند. نتایج بررسی پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ‌های گندم با استفاده از روش GGE biplot در شکل‌های ۱ تا ۳ ارایه شده است. بر این اساس، مولفه‌های اصلی اول و دوم بهترتب ۷۶/۳۸ و ۱۴/۹۳ درصد و در مجموع ۹۱/۳۰ درصد از واریانس را تبیین کردند، به عبارت دیگر، GGEbiplot درصد از تغییرات عملکرد توسط مدل توجیه شده است. در با پلات یک چندضلعی (شکل ۱-a)

جدول ۶- روش گزینش همزمان ژنوتیپ‌های گندم نان برای پایداری و وزن هزار دانه

Table 6. Simultaneous selection method of bread wheat genotypes for stability and 1000-grain weight

ژنوتیپ Genotype	وزن هزار دانه 1000-grain weight	وزن هزار دانه 1000-grain weight rank	رتبه	تصحیح رتبه Correcting 1000-grain weight rank	وزن هزار دانه 1000-grain weight rank	تصحیح شده Corrected rank	روابط Shukla's stability variance	واریانس پایداری Shukla's Stability rate	میزان پایداری Simultaneous selection of 1000-grain weight and stability	وزن هزار دانه و پایداری Simultaneous selection of 1000-grain weight and stability
1	33.22	18	1	19	72.46**	-8			11	
2	31.49	13	1	14	26.90**	-8			6	
3	24.32	1	-1	0	5.11 ⁺	-2			-2	
4	31.73	3	-1	2	69.41**	-8			-6	
5	33.62	20	1	21	25.07**	-8			13	
6	29.08	8	-1	7	3.20 ^{ns}	0			7	
7	30.68	9	1	10	20.43**	-8			2	
8	33.41	19	1	20	27.72**	-8			12	
9	31.57	14	1	15	26.88**	-8			7	
10	28.63	7	-1	6	11.39*	-4			2	
11	31.66	15	1	16	14.56*	-4			12	
12	31.26	12	1	13	49.55**	-8			5	
13	31.06	10	1	11	30.11**	-8			3	
14	31.72	16	1	17	12.46*	-4			13	
15	31.21	11	1	12	18.64**	-8			4	
16	28.07	2	-1	1	20.45**	-8			-7	
17	33.04	17	1	18	31.94**	-8			10	
18	28.58	6	-1	5	30.97**	-8			-3	
19	28.54	5	-1	4	44.12**	-8			-4	
20	28.41	4	-1	3	41.94**	-8			-5	
میانگین Mean		30.565							4.0	

ns, +, * and **: Not-significant and significant at 10%, 5% and 1% probability levels, respectively.
 ** و ns: بهترتب غیرمعنی دار و معنی دار در سطوح احتمال ۱۰٪ و ۵٪ و ۱٪.

جدول ۷- روش گزینش همزمان ژنوتیپ‌های گندم نان برای پایداری و تعداد دانه در سنبله

Table 7. Simultaneous selection method of bread wheat genotypes for stability and grain number per spike

Genotype	رتبه		تصحیح رتبه Correcting rank	رتبه تصحیح شده Corrected rank	واریانس پایداری Shukla's stability variance	میزان پایداری Stability rate	گزینش همزمان تعداد دانه و پایداری Simultaneous selection of grain number and stability
	تعداد دانه در سنبله	تعداد دانه در سنبله					
1	33.24	19	1	20	19.65*	-4	16
2	24.32	7	-1	6	20.82 ⁺	-2	4
3	23.24	6	-1	5	10.45 ⁺	-2	3
4	26.42	11	1	12	10.49 ⁺	-2	10
5	34.12	20	2	22	191.11**	-8	14
6	30.3	17	1	18	5.45 ^{ns}	0	18
7	22.82	4	-1	3	13.27 ⁺	-2	1
8	24.68	8	-1	7	133.36 ^{ns}	0	7
9	27.56	14	1	15	89.54**	-8	7
10	22.46	3	-1	2	15.33 ⁺	-2	0
11	20.16	1	-1	0	163.95**	-8	-8
12	20.94	2	-1	1	6.70 ⁺	-2	-1
13	27.34	13	1	14	61.98**	-8	6
14	26.45	12	1	13	16.83 ⁺	-2	11
15	29.42	15	1	16	31.66**	-8	8
16	25.9	9	-1	8	11.00 ^{ns}	0	8
17	30.5	18	1	19	36.42**	-8	11
18	25.94	10	-1	9	26.76 ^{ns}	0	9
19	29.51	16	1	17	46.15 ⁺	-2	15
20	23.32	5	-1	4	17.68 ⁺	-2	2
میانگین	25.932					7.05	
Mean							

ns, +, * و **: بهترتبیغ غیرمعنی دار و معنی دار در سطوح احتمال ۱۰٪، ۵٪ و ۱٪.

ns, +, * and **: Not-significant and significant at 10%, 5% and 1% probability levels, respectively.

ژنوتیپ ایده‌آل نیز با استفاده از روش گرافیکی GGEbiplot تعیین شد (شکل ۱-۲). ژنوتیپ ایده‌آل ژنوتیپی است که از میانگین عملکرد بالا و پایداری بالا برخوردار باشد و از نظر مکانی در مرکز دوایر متعددالمرکز بای‌پلات قرار دارد. ایده‌آل‌ترین ژنوتیپ‌ها در مرکز دوایر متعددالمرکز واقع می‌شوند و ژنوتیپ‌هایی که نزدیک به ژنوتیپ ایده‌آل باشند، به عنوان ژنوتیپ‌های بستر معرفی می‌شوند. بر این اساس، ژنوتیپ ۵ نزدیک‌ترین ژنوتیپ به مرکز بای‌پلات بود و به عنوان ژنوتیپ ایده‌آل شناخته شد. ژنوتیپ‌های ۸ و ۶ نیز نزدیک به ایده‌آل‌ترین ژنوتیپ بودند و به عنوان ژنوتیپ‌های بستر معرفی می‌شوند. محیط ایده‌آل نیز محیطی است که از نظر مکانی در مرکز دوایر متعددالمرکز بای‌پلات قرار دارد و محیطی که فاصله کمتری از مرکز داشته باشد، محیط بهتری است. محیط ایده‌آل نماینده مناسبی برای بررسی ژنوتیپ‌ها می‌باشد. بر

رتبه‌بندی ژنوتیپ‌ها بر اساس عملکرد دانه و میزان پایداری عملکرد آن‌ها در شکل ۱-a/b ارایه شده است. خطی که از مرکز بای‌پلات (مبدأ) می‌گذرد و بر محور میانگین محیط‌ها عمود است، جهت تعیین پایداری ارقام استفاده می‌شود، به طوری که ژنوتیپ‌هایی که نزدیک به مبدأ این محور قراردارند، نسبت به آن‌هایی که نزدیک به انتهای این خط هستند و در راستای محور عمودی، خط کوتاه‌تری تشکیل می‌دهند، پایداری بیشتری دارند و به تغییر محیط واکنش زیادی نشان نمی‌دهند. با توجه به شکل ۲، ژنوتیپ ۱۲ شماره ۵ بالاترین میانگین عملکرد و ژنوتیپ شماره ۱۲ پایین‌ترین میزان عملکرد را نشان دادند. همچنین، ژنوتیپ‌های ۵، ۸ و ۶ پایدارترین ژنوتیپ‌ها شناخته شدند. پایداری زمانی محقق می‌شود که عملکرد متوسط و بیشتر در نظر گرفته شود.

صفت تعداد دانه در سنبله نیز ژنوتیپ‌های شماره ۱، ۵، ۱۷ و ۱۵ و در صفت تعداد سنبله در مترمربع، ژنوتیپ‌های شماره ۱۵، ۶، ۱۶ و ۵ به عنوان ژنوتیپ‌های پایدار انتخاب شدند. در نهایت در صفت عملکرد دانه نیز ژنوتیپ‌های شماره ۵، ۸، ۶، ۱ و ۱۷ به ترتیب به عنوان ژنوتیپ‌های GGE biplot پایدار انتخاب شدند. بنابراین، نتایج روش GGE biplot در مجموع برای عملکرد و اجزای عملکرد نشان داد که ژنوتیپ‌های شماره ۵، ۱، ۱۵، ۱۷ و ۸، ژنوتیپ‌های پایداری هستند.

این اساس، محیط‌های ۳ و ۵ به عنوان محیط‌های ایده‌آل شناخته شدن. ولتاًز و همکاران (Voltas *et al.*, 2005) و سامونته و همکاران (Samonte *et al.*, 2005) تاکید کردند که مدل رگرسیون مکانی در آزمایش‌های ناحیه‌ای عملکرد، بیشترین کارآیی را در توجیه تغییرات داشته و استفاده از آن نتایج بهتر و موثری در برداشت.

نتایج حاصل از روش GGE biplot نشان داد که در مورد وزن هزار دانه به ترتیب ژنوتیپ‌های شماره ۴، ۵، ۱۷ و ۴ به عنوان ژنوتیپ‌های پایدار محسوب می‌شوند. در

جدول ۸- روش گزینش همزمان ژنوتیپ‌های گندم نان برای پایداری و تعداد سنبله در مترمربع

Table 8. Simultaneous selection method of bread wheat genotypes for stability and spike number per m²

ژنوتیپ Genotype	تعداد سنبله در مترمربع No. of spike/m ²	تعداد سنبله در مترمربع No. of spike rank	رتبه تعداد سنبله Correcting rank	تصحیح رتبه رتبه Shukla's stability variance	رتبه تصحیح شده Corrected rank	واریانس پایداری Shukla's stability variance	میزان پایداری Stability rate	گزینش همزمان تعداد سبله و پایداری Simultaneous selection of spike number and stability
1	300.9	17	1	18	2033 ^{ns}	0	18	
2	296.7	13	1	14	4657 ⁺	-2	12	
3	259.2	5	-1	4	2577 ^{ns}	0	4	
4	261.2	6	-1	5	2330 ^{ns}	0	5	
5	298.0	15	1	16	7660 ^{ns}	0	16	
6	310.9	19	1	20	1403 ^{ns}	0	20	
7	267.4	11	-1	10	1897 ^{ns}	0	10	
8	230.4	3	-1	2	8085 ⁺	-2	0	
9	274.4	2	-1	1	9977 ^{ns}	0	1	
10	298.5	16	1	17	5460 ^{ns}	0	17	
11	209.4	1	-1	0	13159 ^{ns}	0	0	
12	269.1	12	-1	11	14495 ^{ns}	0	11	
13	261.9	7	-1	6	3562 ^{ns}	0	6	
14	264.0	9	-1	8	864 ^{ns}	0	8	
15	334.5	20	1	21	15665 ^{**}	-8	13	
16	297.3	14	1	15	1474 ^{ns}	0	15	
17	308.5	18	1	19	2997 ^{ns}	0	19	
18	252.0	4	-1	3	2997 ^{ns}	-2	1	
19	266.1	10	-1	9	522 ^{ns}	0	9	
20	260.1	8	-1	7	51 ^{ns}	0	7	
Mean میانگین	276.025						9.6	

ns, +, * and **: به ترتیب غیرمعنی‌دار و معنی‌دار در سطوح احتمال ۱۰٪، ۵٪ و ۱٪ و ns, +, * و **: به ترتیب غیرمعنی‌دار و معنی‌دار در سطوح احتمال ۱۰٪، ۵٪ و ۱٪.

ns, +, * and **: Not-significant and significant at 10%, 5% and 1% probability levels, respectively.


جدول ۹- روش گزینش همزمان ژنوتیپ‌های گندم نان برای پایداری و عملکرد دانه

Table 9. Simultaneous selection method of bread wheat genotypes for stability and grain yield

Genotype	Yield (t/ha)	عملکرد ژنوتیپ	عملکرد رتبه عملکرد	تصحیح رتبه Correcting rank	رتبه تصحیح شده Corrected rank	واریانس پایداری شوکلا Shukla's stability variance	میزان پایداری Stability rate	گزینش همزمان عملکرد و پایداری Simultaneous selection of yield and stability
1	5.623	18	2	20	3.965**	-8	12	
2	3.29	10	-1	9	0.638*	-4	5	
3	2.402	2	-1	1	0.800**	-8	-7	
4	3.812	15	-1	14	0.920*	-4	10	
5	6.475	20	3	23	4.831**	-8	15	
6	4.083	16	1	17	0.334 ^{ns}	0	17	
7	3.039	7	-1	6	-0.017 ^{ns}	0	6	
8	6.382	19	2	21	9.352**	-8	13	
9	3.317	11	-1	10	0.044 ^{ns}	0	10	
10	2.851	5	-1	4	0.093 ^{ns}	0	4	
11	3.660	14	-1	13	0.161 ⁺	-2	11	
12	2.301	1	-1	0	0.336 ⁺	-2	-2	
13	3.508	13	-1	12	0.105 ^{ns}	0	12	
14	3.247	9	-1	8	0.823*	-4	4	
15	3.386	12	-1	11	1.368**	-8	3	
16	3.201	8	-1	7	0.892*	-4	3	
17	5.195	17	1	18	7.590**	-8	10	
18	2.944	6	-1	5	2.038**	-8	-3	
19	2.778	3	-1	2	1.298**	-8	-6	
20	2.836	4	-1	3	0.227 ⁺	-2	1	
میانگین Mean	3.866						5.9	

ns, +, * and **: بهترتب غیرمعنی دار و معنی دار در سطوح احتمال ۰.۱ و ۰.۵ و ۰.۱٪ و ۰.۰۵٪.

ns, +, * and **: Not-significant and significant at 10%, 5% and 1% probability levels, respectively.



شکل ۱- روش GGE-biplot. a) چندضلعی برای تعیین بهترین ژنوتیپ و محیط از نظر عملکرد دانه، b) میانگین عملکرد دانه و پایداری ژنوتیپ‌ها، c) تعیین ژنوتیپ ایده‌آل و محیط ایده‌آل. اعداد با رنگ آبی و سبز بهترتب محیط‌ها و ژنوتیپ‌ها را نشان می‌دهند.

Figure 1. GGE-biplot method. a) Polygonal for determining the best genotype and medium for grain yield, b) Average of grain yield and genotypes stability, c) Determining the ideal genotype and environment. The numbers with blue and green color indicate environments and genotypes, respectively.

بودند و در بیشتر روش‌ها رقم گاسکوئن و لاین C-81-14 به ترتیب با میانگین عملکرد دانه ۷۸۴۱ و ۸۲۵۰ کیلوگرم در هکتار دارای عملکرد دانه پایدارتری بودند.

نتیجه‌گیری کلی

تجزیه پایداری به روش رتبه‌ای نشان داد که به ترتیب ژنتیپ‌های ۱، ۵، ۶ و ۸ از نظر عملکرد دانه، ژنتیپ‌های برتر بودند. بر اساس روش ابرهارت و راسل نیز در میان ژنتیپ‌های مطالعه شده، ژنتیپ‌های ۷، ۶، ۹، ۱۰ و ۱۳ به عنوان برترین ژنتیپ‌ها از نظر عملکرد دانه بودند. روش گزینش همزمان برای عملکرد و اجزای عملکرد نیز نشان داد که از نظر وزن هزار دانه ژنتیپ‌های ۵، ۱۴، ۸، ۱۱ و ۱، از نظر تعداد دانه در سنبله ژنتیپ‌های ۶، ۱، ۱۹، ۵، ۱۷ و ۱۴، از نظر تعداد سنبله در مترمربع ژنتیپ‌های ۶، ۱۷، ۱، ۱۰ و ۵ و از نظر عملکرد دانه ژنتیپ‌های ۶، ۵، ۸، ۱، ۱۳، ۱۱ و ۱۷ ژنتیپ‌های پرمحصول و پایدار در همه محیط‌ها بودند. بدطورکلی، نتایج حاصل نشان داد که روش رتبه‌ای تا حدود زیادی نتیجه یکسان با روش گزینش همزمان ارایه داد و این دو روش ارقام پرمحصول و پرپتانسیل از نظر عملکرد را به عنوان رقم‌های برتر این محیط‌ها معرفی کردند. در صورتی که در روش ابرهارت و راسل، ارقام با پتانسیل تا حدودی بالاتر از میانگین کل به عنوان ارقام مناسب شناسایی شدند. بنابراین، برای انتخاب ارقام پرمحصول و پایدار و قابل توصیه به همه محیط‌ها پیشنهاد می‌شود از روش گزینش همزمان یا رتبه‌ای استفاده شود. در مجموع بر اساس نتایج به دست آمده از روش‌های مختلف تجزیه پایداری در این تحقیق، ژنتیپ شماره ۵ با شجره 158-Yang87 و ژنتیپ شماره ۸ با شجره Milan-CM75118-B-5M-1Y-05M به عنوان ژنتیپ‌های بودند و قابل توصیه به زارعین جهت کشت در محیط‌های هدف هستند.

مهتا و همکاران (Mehta *et al.*, 2000) ضمن مطالعه پایداری ارقام گندم از روش ابرهارت و راسل برای تعیین ارقام سازگار و با عملکرد پایدار استفاده و ارقام با عملکرد بالا، ضریب رگرسیون بالاتر از یک و انحراف از خط رگرسیون کم را برای مناطق حاصل خیز توصیه کردند. روسستایی و همکاران (Roustanayi *et al.*, 2004) نیز در بررسی سازگاری و پایداری عملکرد دانه ژنتیپ‌های پیشرفت‌های گندم نان در مناطق گرمسیر و نیمه‌گرمسیر از روش‌های لین و بینز، ضریب تغییرات و روش غیرپارامتری رتبه استفاده و رقم کوهدهشت (Tr8010200) را به عنوان پایدارترین و پرمحصول‌ترین رقم در بین ژنتیپ‌های مورد مطالعه گزارش کردند. رحیمی و همکاران (Rahimi *et al.*, 2009) نیز جهت تعیین پایداری عملکرد دانه ارقام و لاین‌های گندم، تاریخ کاشت مناسب و ژنتیپ‌های پرمحصول برای اقلیم معتمد کشور، ارقام ۱۵ و لاین امیدبخش گندم را در سه تاریخ کاشت ارزیابی کردند و برای بررسی دقیق‌تر، تجزیه پایداری را با روش‌های مختلف انجام دادند. نتایج حاصل از روش‌های ارزیابی شده تا اندازه‌ای مشابه بودند و در بیشتر روش‌ها رقم شیراز با میانگین عملکرد ۹/۷۹ تن در هکتار پایدارترین رقم شناخته شد.

ژیانی و همکاران (Zhyani *et al.*, 2010) نیز جهت مقایسه ژنتیپ‌ها در محیط‌های مختلف به علت وجود برهمکنش ژنتیپ × محیط و به منظور تعیین پایداری عملکرد دانه ده ژنتیپ پیشرفت‌های گندم زمستانه و بینابین، آزمایش‌هایی را در دو سال و در نه ایستگاه تحقیقاتی اقلیم سرد کشور انجام دادند و با استفاده از روش‌های مختلف تجزیه پایداری، ژنتیپ‌های Yan(1) و Yan(3) را که در چند روش برتر بودند، به عنوان پایدار گزارش کردند. نجفی میرک (Najafi Mirak, 2011) ۱۵ لاین و رقم گندم نان زمستانه را در هشت منطقه مختلف با استفاده از روش‌های مختلف تجزیه پایداری بررسی کرد. نتایج حاصل از روش‌های مختلف تا حدود زیادی مشابه

References

- Akcura, M., Kaya, Y., Taner, S. and Ayranici, R. 2006. Parametric stability analysis for grain yield of durum wheat. *Plant, Soil and Environment* 52 (6): 254-262.
- Alizadeh, B. and Tarinejad, A. R. 2010. Application of MSTAT-C software in statistical analysis. Second edition. Stoude Press, Tabriz, Iran.
- Dashtaki, M., Yazdansepas, A., Najafi Mirak, T., Ghannadha, M. R., Jokar, R., Eslampour, M. R., Moayyedi, A. A., Kochaki, A. R., Nazeri, M., Abedi Oskouyi, M. S., Aminzade, Gh. R., Soltani, R. and Ashori, Sh. 2004. Study on grain yield stability and harvest index in winter and

- facultative bread wheat cultivars (*Triticum aestivum* L.). **Seed and Plant Improvement Journal** 20: 263-279. (In Persian with English Abstract).
- Eberhart, S. A. and Russell, W. A. 1966.** Stability parameters for comparing varieties. **Crop Science** 6: 36-40.
- Francis, T. R. and Kannenberg, L. W. 1978.** Yield stability studies in short-season maize. **Canadian Journal of Plant Science** 58: 1025-1034.
- Gabriel, K. R. 1971.** The biplot graphic display of matrices with application to principal component analysis. **Biometrika** 58: 453-467.
- Gauch, H. G. 2006.** Statistical analysis of yield trials by AMMI and GGE. **Crop Science** 46: 1488-1500.
- Jarrah, M. and Geng, I. 1997.** Variability of morphophysiological traits of mediterranean durum cultivars. **Rachis** 16 (1/2): 52-56.
- Kang, M. S. 1993.** Simultaneous selection for yield and stability in crop performance trials. Consequences for growers. **Agronomy Journal** 85: 754-757.
- Mahfouzi, S., Amini, A., Chaichi, M., Jasemi, S. Sh., Nazeri, M., Abedi Skouyi, M. S., Aminzade, Gh. and Rezayi, M. 2009.** Investigation on grain yield stability of winter bread wheat genotypes by using different stability parameters under end season drought stress. **Seed and Plant Improvement Journal** 25 (1): 82-65. (In Persian with English Abstract).
- Mehta, H., Sawhney, R. N., Singh, S. S., Chaudhary, H. B., Sharma, D. N. and Sharma, J. B. 2000.** Stability analysis of high yielding wheat at varying fertility levels. **Indian Journal of Genetics** 60 (4): 471-476.
- Nadergoli, M. S., Yarnia, M. and Khoei, F. R. 2011.** Effect of zinc and manganese their application method on yield and yield components of common bean (*Phaseolus vulgaris* L. cv. Khomein). **Middle-East Journal of Scientific Research** 8 (5): 859-865.
- Najafi Mirak, T. 2011.** Study of grain yield stability of bread wheat genotypes in cold agro-climatic zone of Iran. **Iranian Journal of Crop Science** 13 (2): 380-394. (In Persian with English Abstract).
- Pinthus, M. J. 1973.** Estimation of genotypic value: A proposed method. **Euphytica** 22: 121-123.
- Rahimi, M., Najafi Mirak, T. and Rashidi, V. 2009.** Grain yield stability of wheat cultivars with different growth habit in medditeranian zone. **Seed and Plant Improvement Journal** 25 (1): 451-469. (In Persian with English Abstract).
- Roemer, T. 1947.** Sind die Ertragsreichen Sorten Ertragssichers? **Mitt. DLG** 32:87-89.
- Shukla, G. K. 1972.** Some statistical aspects of partitioning genotype- environmental components of variability. **Heredity** 29: 237-245.
- Roustayi, M., Hossinpour Hossini, K. T., Kalate, M. and Khalilzade, Gh. R. 2004.** Investigation on grain yield stability and adaptation of advanced bread wheat lines in warm and semi warm arid region. **Iranian Journal of Agriculture Science** 35 (2): 427-436. (In Persian with English Abstract).
- Soltain, A. 2012.** Application of SAS software in statistical analysis. Mashhad University Jehad Press, Mashhad, Iran.
- Soughi, H., Vahabzade, M., Kalate Arabi, M., Alat Jafarby, J., Khavarinejad, S., Gasemi, M., Fallahi, H. A. and Amini, A. 2009.** Investigation on yield stability of promised bread wheat lines in warm and humid zone in north of Iran. **Seed and Plant Breeding Journal** 25 (1): 211-222. (In Persian with English Abstract).
- Wricke, G. 1962.** Über eine methode zur refassung der okologischen streubretite in feldversuchen. **Flazenzuecht** 47: 92-96.
- Yan, W., Hunt, L. A., Sheng, Q. and Szlavnics, Z. 2000.** Cultivar evaluation and mega-environment investigation based on the GGE biplot. **Crop Science** 40: 597-605.
- Yang, R., Crossa, J., Cornelius, P. and Bugueño, J. 2009.** Biplot analysis of genotype x environment interaction: Proceed with caution. **Crop Science** 49: 1564-1576.
- Zhyani, A., Yazdansepas, A., Peygambari, S. A. and Khodarahmi, M. 2010.** Study on yield stability of winter and facultative bread wheat cultivars in some cold region. **Agronomy and Plant Breeding** 6 (2): 37-49. (In Persian with English Abstract).



Investigating the compatibility of bread wheat genotypes using Eberhart-Russell, simultaneous selection, bi-plot and non-parametric ranking methods

Alireza Tarinejad^{1*}

Received: August 17, 2014

Accepted: January 25, 2016

Abstract

To study the stability of 20 bread wheat genotypes for grain yield and yield components, an experiment was carried out in randomized complete block design with two replications in five environments in East Azarbaijan provience, Tabriz and Meyane agricultural stations, Iran, during 2011-2014. The results of combined analysis of variance showed that the genotype \times environment interaction was significant (at least $p<0.05$) for yield and yield components. Therefore, the stability analysis of the studied genotypes was conducted for yield and yield components using Eberhart and Russull, simultaneous selection and ranking non-parametric methods. Result from the combination of these methods showed that the genotypes 5, 14 and 8 for 1000-grain weight, the genotypes 1, 5 and 6 for number of grain per spike and the genotypes 6 17 and 1 for number of spike per m^2 , besides having less interaction with the environment than the other genotypes, had also higher yield potential. Hovewer, for grain yield the genotypes 5 (Yang87-158) and 8 (Milan CM75118-B-5M-1Y-05M) with grain yield of 6.47 and 6.38 t/ha, respectively, had less interaction with the environment and more stability and can be recommended for cultivation in similar climate in spring. The result of this research also showed that the stability analysis by ranking method had similar results with simultaneous selection method.

Keywords: Genotype \times environment interaction, Grain yield and yield components, Stability

1. Associate Prof., Dept. of Biotechnology, Faculty of Agriculture, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran

* Corresponding author: atarinejad@yahoo.com